

範例* CapsoCam Plus® 腸道準備說明

*為醫生提供的說明範例，用於患者腸道準備，以確保小腸乾淨並取得良好的檢查結果。在提供腸道準備說明時，醫生應考慮每位患者的具體情況。有已知腸道動力問題的患者（如胃排空延遲、胃瀦留、頻繁便秘、有大腸鏡檢查難以觀察的腸道等）可能需要更積極的腸道準備或改變腸道準備方法。

此腸道準備說明由醫生與其患者確定並測試過，可以實現三個主要目標：(1) 盡可能提高小腸的可視度、(2) 膠囊盡快排出體外，以及(3) 糞便盡可能鬆散，便於收集膠囊，目的是盡可能利用患者膠囊內視鏡檢查的臨床結果。

使用CapsoCam Plus®進行膠囊內視鏡檢查的患者腸道準備說明

上午膠囊吞入預約

*註：如果服用口服補鐵劑，請在檢查前4(整)天停止服用。

您的膠囊內視鏡檢查安排在： _____

地址： _____

週幾 _____ 日期 _____ 時間 _____

檢查前一天

日期：	像往常一樣吃早餐，然後吃清淡且少量的午餐。隨後，在檢查前一天的其他時間(包括晚上)進食清澈的液體飲食(不要喝任何紅色液體)。
日期： 時間：晚上7:00	將7勺(119公克)聚乙二醇(MiraLAX®、ClearLax®、PureLax®、GaviLax®、LavaClear®品牌)與32盎司(950 ml)水混合，然後全部喝下。
日期： 時間：晚上9:30	在晚上9:30，用8盎司(240 ml)水送服0.6毫升二甲矽油(Mylicon®)滴劑。 這將減少消化道中的氣泡。 晚上10點後不要喝任何液體。允許用少量水服用藥物。

檢查當天

日期： 時間：上午	除非醫生認為有必要，否則應等到吞入膠囊後2小時再用少量水服用藥物。
日期： 時間：	在預定吞入膠囊前兩(2)小時，將1勺(17公克)聚乙二醇(MiraLax®、ClearLax®等)與一整杯水(240 ml)混合。聚乙二醇的瓶蓋是一個測量蓋，粉末填充到指示線時為17公克。
日期： 時間：	到達醫生辦公室/診所。
時間：	在8盎司(240 ml)水中加入0.6毫升二甲矽油(Mylicon®)滴劑，然後吞入CapsoCam Plus膠囊。
時間：	吞嚥膠囊後2小時內，繼續飲用清澈的液體。
時間：	吞入膠囊4小時後，將17公克聚乙二醇(MiraLax®、ClearLax®等)與一整杯水(240 ml)混合，然後全部喝下。
時間：	在服用上一劑聚乙二醇後，您可以吃清淡且少量的午餐。 請記錄您午餐吃了什麼。 _____ 像往常一樣吃晚餐。不需要進一步限制飲食。

重要患者資訊

- 為獲得最佳結果，請嚴格按照說明操作。膠囊通常需要3-30小時才能排出體外。如果您在吞入膠囊後72小時仍然沒有排出膠囊，請聯絡醫生。
- 要觀看膠囊收集影片說明，請瀏覽<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>
- 為避免重複檢查，請遵循膠囊收集說明，直至收集到膠囊。持續使用提供的收盤，直到收集到膠囊。
- 按照指示將膠囊送回醫生處。

送回膠囊：您的醫生選擇的送回方式

- 將膠囊放在膠囊收集套件中提供的小瓶內，然後在正常工作時間內送回醫生辦公室。

如果您有任何疑問，請聯絡我們的辦公室：_____

購買腸道準備藥物

註：腸道準備藥物有多種劑型：購買腸道準備藥物時，請確保您獲得足夠的腸道準備藥物。

聚乙二醇 (MiraLAX®、ClearLax®、PureLax®、GaviLax®、LavaClear® 品牌)。至少購買153公克的腸道準備藥量。

二甲矽油 (Mylicon®) 滴劑：購買最小劑量即可，您所需要的總量是1.2毫升。