

Beispiel* für CapsoCam Plus® Anweisungen zur Vorbereitung

*Die Anweisungen sollen Ärzten als Beispiel für eine Patientenvorbereitung dienen, mit der sich ein sauberer Dünndarm und ein günstiges Behandlungsergebnis erzielen lassen. Der Arzt muss bei der Ausstellung von Anweisungen zur Vorbereitung den individuellen Zustand jedes Patienten berücksichtigen. Patienten mit bekannten Motilitätsproblemen (z. B. verzögerte Magenentleerung, Magenretention, häufige Verstopfung, schwierige Zugänglichkeit bei der Koloskopie usw.) benötigen möglicherweise eine aggressivere oder modifizierte Vorbereitung.

Diese Vorbereitung wurde von Ärzten zusammen mit ihren Patienten erarbeitet und getestet, um drei primäre Endpunkte zu erreichen: (1) optimale Darstellung des Dünndarms, (2) schnellste Kapselpassage und (3) lockerster Stuhl, um die Bergung mit dem Ziel zu erleichtern, die klinischen Ergebnisse der Kapselendoskopie-Untersuchung Ihres Patienten zu maximieren.

Anweisungen zur Vorbereitung von Patienten auf die Kapselendoskopie mit CapsoCam Plus®

Termin zur Einnahme am Morgen

*HINWEIS: Wenn Sie ein orales Eisenpräparat einnehmen, beenden Sie die Einnahme bitte 4 volle Tage vor dem Test.

Ihre Kapselendoskopie-Untersuchung ist am: _____

Adresse: _____

Tag _____ Datum _____ Uhrzeit _____

Tag vor der Untersuchung

Tag:	Frühstücken Sie wie gewohnt und essen Sie eine leichte Mahlzeit zu Mittag. Nehmen Sie dann für den Rest des Tages/der Nacht nur noch klare Flüssigkeiten zu sich. (Keine Getränke mit rotem Farbstoff.)
Tag: Uhrzeit: 19.00	Mischen Sie 7 volle Kappen (119 Gramm) Polyethylenglykol (Marken MiraLAX®, ClearLax, PureLax, GaviLax, LavaClear) mit etwa 1 l (32 oz) Wasser oder Gatorade® oder zuckerfreiem Gatorade (nicht rot) und trinken Sie den gesamten Inhalt.
Tag: Uhrzeit: 21.30	Nehmen Sie um 21:30 Uhr 0,6 ml Mylicon®-Tropfen mit etwa 240 ml (8 oz) Wasser ein. Dadurch wird Blasenbildung im Magen-Darm-Trakt vermindert. Trinken Sie ab 22 Uhr nichts mehr. Ein paar Schlückchen Wasser mit Medikamenten sind erlaubt.

Tag der Untersuchung

Tag: Uhrzeit: Morgens	Nehmen Sie bis 2 Stunden nach Einnahme der Kapsel keine Medikamente ein, es sei denn, Ihr Arzt hält es für notwendig. Nehmen Sie die Medikamente in diesem Fall mit einem kleinen Schluck Wasser ein.
Tag: Uhrzeit:	Mischen Sie zwei (2) Stunden vor der geplanten Einnahmezeit der Kapsel 1 volle Kappe (17 Gramm) Polyethylenglykol (MiraLax, ClearLax usw.) mit einem Glas Wasser oder Gatorade (nicht rot). Die Kappe der Polyethylenglykol-Flasche ist ein Messbecher, der eine Markierung enthält, die bei Füllung bis zu dieser Linie 17 Gramm Pulver angibt.
Tag: Uhrzeit:	Ankunft in der Praxis/Klinik.
Uhrzeit:	Nehmen Sie die CapsoCam Plus-Kapsel mit 0,6 ml Mylicon-Tropfen in etwa 240 ml (8 oz) Wasser ein.
Uhrzeit:	Nehmen Sie 2 Stunden nach dem Herunterschlucken der Kapsel wieder klare Flüssigkeiten zu sich.
Uhrzeit:	Mischen Sie vier Stunden nach Einnahme der Kapsel 17 Gramm Polyethylenglykol (MiraLax, ClearLax usw.) mit einem Glas Wasser oder Gatorade (nicht rot), und trinken Sie den gesamten Inhalt.
Uhrzeit:	Essen Sie zu Mittag eine leichte Mahlzeit, wenn Sie die letzte Dosis Polyethylenglykol genommen haben. Bitte geben Sie an, was Sie zu Mittag gegessen haben. _____ Essen Sie wie gewohnt zu Abend. Es müssen keine weiteren speziellen Ernährungsvorgaben mehr befolgt werden.

Wichtige Patienteninformation

- Befolgen Sie für bestmögliche Ergebnisse die Anweisungen genauestens. Die Kapsel wird in der Regel nach 3 bis 30 Stunden ausgeschieden. Wenn Sie die Kapsel 72 Stunden nach Einnahme der Kapsel noch nicht ausgeschieden haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Das Video zur Bergung der Kapsel finden Sie hier id <https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>.
- Um eine Wiederholung dieser Untersuchung zu vermeiden, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur Bergung der Kapsel, bis es so weit ist. Verwenden Sie die bereitgestellte Auffangpfanne so lange, bis Sie die Kapsel geborgen haben.
- Geben Sie die Kapsel gemäß Anweisung Ihrem Arzt zurück.

Rückgabe der Kapsel: Optionen, die Ihr Arzt vorgibt

- Geben Sie die Kapsel **in dem Fläschchen**, das dem Bergungsset beiliegt, in der Arztpraxis zu den entsprechenden Öffnungszeiten ab.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Büro: _____

Kauf der Medikamente zur Vorbereitung

Hinweis: Medikamente zur Vorbereitung sind in verschiedenen Mengen erhältlich: Stellen Sie beim Kauf Ihrer Medikamente zur Vorbereitung sicher, dass Sie für die gesamte Vorbereitung eine ausreichende Menge anfordern.

Polyethylenglycol (Dulcosoft Losun, Moviprep, Citrafleet). Kaufen Sie einen oder mehrere Behälter mit mindestens 153 Gramm (es wird wahrscheinlich etwas übrig bleiben).

Simethicon – kleinstmögliche Flasche – Sie werden insgesamt nur 1.2 ml benötigen.