

Exemple* de préparation patient à une endoscopie du grêle par video-capsule CapsoCam Plus®

*Ces instructions sont proposées aux utilisateurs de Capsocam Plus à titre d'exemple pour permettre une bonne préparation de l'intestin grêle et garantir la réussite de son exploration. Le médecin doit prendre en compte l'état de santé de chaque patient avant de prescrire des instructions de préparation. Les patients qui présentent des troubles de motilité connus (p. ex. ralentissement de la vidange gastrique, rétention gastrique, constipation fréquente, difficulté de progression pendant la coloscopie, etc.) peuvent nécessiter une préparation plus poussée ou modifiée.

Cette préparation a été sélectionnée et testée par des médecins auprès de leurs patients pour satisfaire à trois critères principaux :

- (1) visualisation optimale de l'intestin grêle,
- (2) accélération du transit de la capsule
- (3) ramollissement des selles pour faciliter la récupération de la capsule

Préparation patient à une endoscopie du grêle par vidéocapsule CapsoCam Plus®

Important : si vous prenez du fer en complément alimentaire par voie orale, veuillez arrêter la prise 4 jours complets avant l'examen.

Votre endoscopie par vidéocapsule aura lieu à : _____

Adresse : _____

Jour _____ Date _____ Heure _____

Jour J-1 précédent l'examen

Jour J-1 :	Prenez un petit-déjeuner normal, suivi d'un déjeuner léger. Consommez ensuite uniquement des liquides incolores pendant le reste de la journée précédant l'examen (aucun liquide de couleur rouge).
Jour J-1 : Heure : 19 h	Mélangez 7 bouchons (119 g) de polyéthylène glycol (ColoPeg®, MoviPrep®, KleanPrep®,) dans 1 litre d'eau et buvez le mélange dans sa totalité.
Jour J-1 : Heure : 21 h 30	À 21 h 30, prenez 0.6 ml de Simeicone® diluée dans 240 ml d'eau. Cela réduira la formation de bulles dans votre intestin grêle. Ne buvez plus rien après 22 h. Vous pouvez prendre de petites gorgées d'eau pour avaler vos médicaments.

Jour de l'examen

Jour J : Heure :	Ne prenez vos médicaments que 2 heures après l'ingestion de la capsule, à moins que votre médecin en décide autrement ; prenez-les alors avec de petites gorgées d'eau.
Jour J : Heure :	2 heures avant l'ingestion prévue de la capsule, mélangez 17 g de polyéthylène glycol (ColoPeg®, MoviPrep®, KleanPrep®,) dans un grand verre d'eau.
Jour J : Heure :	Arrivée au cabinet ou à la clinique.
Heure :	Avalez la capsule CapsoCam Plus avec un mélange de 0.6 ml de Simeicone® diluée dans 240 ml d'eau.
Heure :	2 heures après l'ingestion de la capsule, vous pourrez recommencer à boire.
Heure :	4 heures après l'ingestion de la capsule, mélangez 17 g de polyéthylène glycol (ColoPeg®, MoviPrep®, KleanPrep®,) dans un grand verre d'eau et buvez le mélange dans sa totalité. Vous pourrez ensuite prendre un repas léger. Noter ce que vous avez mangé.
Heure :	Au dîner vous pouvez manger normalement. Aucune restriction alimentaire supplémentaire n'est nécessaire.

Informations importantes pour les patients

- Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez scrupuleusement les instructions de préparation.
- La capsule sera en général évacuée dans les 3 à 30 heures. Si vous n'avez pas évacué la capsule 72 heures après son ingestion, contactez votre médecin.
- Pour regarder une vidéo sur la récupération de la capsule, rendez-vous sur le site <https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>
- La récupération de la capsule est indispensable pour recueillir les images.
- En cas de perte de la capsule, il faudra recommencer l'examen.
- Continuez d'utiliser le kit de récupération jusqu'à ce que la capsule soit récupérée.
- Ramenez la capsule chez votre médecin, comme indiqué.

Renvoi de la capsule : option choisies par votre prestataire de soins

- Ramenez la capsule au cabinet du médecin pendant les heures normales d'ouverture **dans le flacon en plastique** fourni avec le kit de récupération.

Veillez appeler notre bureau si vous avez des questions : _____

Achat des médicaments de préparation

Remarque : les produits pour la préparation sont vendus en plusieurs tailles : lorsque vous les achetez, assurez-vous que la quantité est suffisante pour l'ensemble de la préparation.

Polyéthylène glycol (ColoPeg®, MoviPrep®, KleanPrep®,) : achetez un conditionnement contenant au moins 153 g (il vous en restera probablement).

Simeticone® : la plus petite bouteille possible avec verseur goutte à goutte, vous n'aurez besoin que de 1.2 ml au total.